

Bayer Environmental Science



Before using this product read the label carefully. / Lees die etiket noukeurig alvorens die produk gebruik word.

BAYTHROID®
Wetable Powder / Benatbare Poeier

Reg. No. L2198 Act No. 36 of 1947
Namibian Reg. No. N-AR 0013

Reg. Nr. L2198 Wet Nr. 36 van 1947
Namibiese Reg. Nr. N-AR 0013

A RESIDUAL PYRETHROID INSECTICIDE WHICH KILLS FLYING AND CRAWLING INSECT PESTS. KILLS FLIES, INCLUDING STABLE FLIES.

'N NAWERKENDE PIRETROÏED INSEKTEMIDDEL WAT VLIEËNDE EN KRUIPENDE INSEKPLAE DOOD. DOOD VLIEË. INSLUITENDE STALVLIEË.

ACTIVE INGREDIENT / AKTIEWE BESTANDDEEL:

Cyfluthrin (pyrethroid)

100 g/kg

Siflutrin (piretroïed)

NET CONTENTS: / NETTO INHOUD: 20 g

REGISTRATION HOLDER / REGISTRASIEHOUER:

Bayer (Pty.) Ltd. / (Edms.) Bpk.
Reg. No. / Nr. 1968/011192/07
P.O. Box / Posbus 143
ISANDO 1600
SOUTH AFRICA / SUID-AFRIKA
TEL: (011) 921 5911

Batch no: / Lotnommer:

Date of manufacture: / Datum vervaardig:

BAYTHROID® is a registered trademark of Bayer / is 'n geregistreerde handelsmerk van Bayer.

UN. No./ VN Nr. 3077



**CAUTION
VERSIGTIG**



WARNINGS:

Harmful when absorbed through the skin, swallowed or inhaled.
Toxic to fish, bees and wildlife.
Store in a cool place, away from food and feedstuffs.
Keep out of reach of children, animals and uninformed persons.
Do not spray directly onto foodstuffs or onto surfaces on which food is stored or eaten.
May cause irritation of the skin, eyes, mucous membranes and skin sensitization.
Do not apply to surfaces that are easily stained or water-marked unless it has been proven safe on such surfaces.
Do not spray directly onto animals.

PRECAUTIONS:

Do not use in the presence of persons with known sensitivity to pyrethroids.
In the case of signs of sensitivity, obtain medical advice.
Do not inhale dust or spray mist.
Wear protective clothing.
Wash contaminated clothing daily.
Wash with soap and water immediately after use or accidental skin contact.
Do not eat, drink or smoke whilst applying, mixing or before washing hands and face.
Prevent contamination of foodstuffs, food utensils and drinking water.
Clean applicator after use, dispose of wash water where it will not contaminate food, rivers and dams.
Destroy empty container and never use for any other purpose.

DIRECTIONS FOR USE: USE ONLY AS DIRECTED.

Baythroid® WP is a contact pyrethroid insecticide with an initial knockdown action and a long lasting action for the control of flies (including houseflies, stable flies), fly maggots, mosquitoes, cockroaches, bedbugs, fleas, fishmoths and ants. The length of residual action depends on:

- the insect being controlled,
- the type of surface treated,
- the situation (e.g. indoors or outdoors) and
- the weather conditions (e.g. rainfall, temperature),

but in general, under favourable conditions, months of control can be expected indoors and several weeks outdoors.

Baythroid® WP is odourless and can be used indoors or outdoors, e.g. in and around homes, farm buildings, stables, dairies, poultry houses, piggeries, hospitals, schools, military barracks, ships, industrial premises, food handling and processing establishments, refuse dumps, camping sites and market places.

PEST	DOSAGE	REMARKS
Flies: Adults (including houseflies, lesser houseflies, stable flies)	20 g – 40 g / 10 litre water	Apply as a residual spray or with paint brush to surfaces where flies settle, e.g. walls, screen doors, window frames, etc., or spray onto garbage heaps and dung heaps. Apply to the point of wetness, or use 10 litre mixture/100 m ² . Use higher dosage for long lasting control or where infestation is severe. Repeat when necessary.
Fly maggots	5 g / 10 litre water	Apply as a drench using 10 litre mixture / m ² of dung, garbage, straw or compost. Repeat applications should be made every time fresh material is added to heap.
Mosquitoes (Adults)	20 g – 40 g / 10 litre water	Apply as a residual spray or with paint

		brush to surfaces where mosquitoes usually settle, e.g. dark corners, screen doors, ceilings, etc. Apply to point of wetness, or use 10 litre mixture / 100 m ² . Use higher rate for long lasting control or where infestation is severe. Repeat when necessary.
Cockroaches, bedbugs, fleas, fishmoths	20 g / 10 litre water	Apply as a residual spray or with a paint brush to skirting boards, cracks, crevices and other places where insects may hide. Also apply to adjacent exposed surfaces where insects may crawl when they come out of hiding. Apply to point of wetness, or use 10 litre mixture / 100 m ² to obtain long lasting control. Repeat when necessary.
Ants	20 g – 40 g / 10 litre water	Apply as a residual spray or with a paint brush to surfaces over which ants crawl, e.g. skirting boards, window sills, walls, etc. Apply to the point of wetness or use 10 litre mixture / 100 m ² . Use higher dose for long lasting control or where infestation is severe. Repeat when necessary.

For any product enquiry, contact Bayer Environmental Science - 011 921 5911. For poisoning emergencies only, Griffon Poison Information Centre may also be contacted - 082 446 8946.

BAYTHROID[®] is a registered trademark of Bayer.

© Bayer (Pty.) Ltd. All unauthorized reproduction of this label is forbidden.

www.bayerhome.co.za

WAARSKUWINGS:

Skadelik indien deur die vel geabsorbeer, ingeneem of ingeasem.
Giffig vir vis, bye en wild.
Bêre in 'n koel plek, weg van voedsel en voer.
Hou buite bereik van kinders, diere en oningeligte persone.
Moenie direk op voedsel spuit of op oppervlakke waarop voedsel gestoor of geëet word nie.
Kan vel, oë en slymvliese irriteer en vel sensitiseer.
Moenie op oppervlakke toedien wat maklik vlek of watermerke wys nie alvorens gebruik veilig gevind is op sulke oppervlakke.
Moet nie direk op diere spuit nie.

VOORSORGMAATREËLS:

Moet nie in die teenwoordigheid van persone wie sensitief is vir piretroïede, gebruik nie.
In die geval van tekens van sensitiwiteit, kry mediese hulp.
Vermy die inasem van stof of spuitnewel.
Dra beskermende klere.
Was besoedelde klere na afloop van dag se werk.
Was met seep en water na toevallige velkontak en na gebruik.
Moenie eet, drink of rook tydens vermenging en toediening of voordat hande en gesig gewas is nie.
Voorkom besoedeling van voedsel, eetgerei en drinkwater.
Maak spuitapparaat skoon na gebruik – raak ontslae van waswater waar dit nie voedsel, riviere of damme sal besoedel nie.
Vernietig die leë houër en moet dit vir geen ander doel hergebruik nie.

GEBRUIKSAANWYSINGS: GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI.

Baythroid® WP is 'n kontak piretroïede insekdoder met 'n aanvanklike uitklopaksie en 'n nawerkende aksie vir die beheer van vlieë (insluitend huisvlieë, stalvlieë), vliegmaaiers, muskiete, kakkerlakke, weeluse, vlooië, vismotte en miere. Die duur van die nawerkende aksie hang af van:

- die insek wat beheer word,
 - die tipe oppervlak wat behandel word,
 - die plek (bv. binnens- of buitenshuis) en
 - die weersomstandighede (bv. reën, temperatuur),
- maar oor die algemeen onder gunstige omstandighede, kan maande se beheer binnenshuis en verskeie weke se beheer buitenshuis verwag word.

Baythroid® WP is reukloos en kan binnens- en buitenshuis gebruik word, bv. in en om woonhuise, plaasgeboue, stalle, melkerye, hoenderhuise, varkhokke, hospitale, skole, militêre barakke, skepe, industriële en kommersiële persele, aanlegte waar voedsel gehanteer en verwerk word, vullishope, kampeerterreine en markte.

PLAAG	DOSIS	OPMERKINGS
Vlieë: Volwasse (insluitend huisvlieë, klein huisvlieë, stalvlieë)	20 g – 40 g / 10 liter water	Dien as 'n nawerkende bespuiting toe of verf met 'n kwas aan op oppervlakke waar vlieë kom sit, bv. mure, sifdeure, vensterrame, ens. of spuit op vullishope en mishope. Wend aan tot op die punt van benatting, of gebruik 10 liter mengsel / 100 m ² . Gebruik hoër dosis vir langwerkende beheer of waar die vliegprobleem ernstig is. Herhaal wanneer nodig.
Vliegmaaiers	5 g / 10 liter water	Deurweek met 10 liter mengsel / m ² mis, vullis, strooi of kompos. Toedienings moet herhaal word elke keer as vars materiaal by die hoop gevoeg word.

Muskiete (Volwasse)	20 g – 40 g / 10 liter water	Dien as nawerkende bespuiting toe of verf met 'n kwas aan op oppervlakke waar muskiete gewoonlik sit, bv. donker hoeke, sifdeure, plafonne, ens. Wend aan tot op die punt van benatting of gebruik 10 liter mengsel / 100 m ² . Gebruik hoër dosis vir langwerkende beheer of waar die muskiet probleem ernstig is. Herhaal indien nodig.
Kakkerlakke, weeluisse, vlooie, vismotte	20 g / 10 liter water	Dien as 'n nawerkende bespuiting toe of verf met 'n kwas aan op vloerlyste, krake en gleuwe en ander plekke waar insekte kan wegkruip. Dien ook toe op aangrensende blootgestelde oppervlakke waaroor insekte mag kruip wanneer hulle uit hul wegkruipplekke kom. Wend aan tot op die punt van benatting of gebruik 10 liter mengsel / 100 m ² om langwerkende beheer te verkry. Herhaal wanneer nodig.
Miere	20 g – 40 g / 10 liter water	Dien as 'n nawerkende bespuiting toe of verf met 'n kwas aan op plekke waaroor miere kruip bv. vloerlyste, vensterbanke, mure ens. Wend aan tot op die punt van benatting of gebruik 10 liter mengsel / 100 m ² . Gebruik hoër dosis vir langwerkende beheer waar die mier probleem ernstig is. Herhaal wanneer nodig.

Vir enige produk navrae, skakel Bayer Environmental Science - 011 921 5911. Slegs vir vergiftigingsnoodgevalle kan Griffon Gif Inligtingsentrum ook gekontak word - 082 446 8946.

BAYTHROID® is 'n geregistreerde handelsmerk van Bayer.

© Bayer (Edms.) Bpk. Alle ongemagtigde kopiëring van die etiket is verbode.

www.bayerhome.co.za