

Before using this product read the label carefully. / Lees die etiket noukeurig alvorens die produk gebruik word.

## FICAM<sup>®</sup> VC

Reg. No. L3141 Act No. 36 of 1947  
Namibian Reg. No. N-AR 0709  
Mozambique Reg. No. DSV-544

Reg. Nr. L3141 Wet Nr. 36 van 1947  
Namibiese Reg. Nr. N-AR 0709  
Mosambiekse Reg. Nr. DSV-544

A WETTABLE POWDER FORMULATION  
OF A RESIDUAL CONTACT INSECTICIDE  
FOR THE CONTROL OF ADULT  
MALARIA VECTOR MOSQUITOES IN  
STRUCTURES.

'N BENATBARE POEIER FORMULASIE  
VAN 'N NAWERKENDE KONTAK  
INSEKDODER VIR DIE BEHEER VAN  
VOLWASSE MALARIADRAENDE  
MUSKIETE IN STRUKTURE.

### ACTIVE INGREDIENT: / AKTIEWE BESTANDDEEL:

Bendiocarb (carbamate)

800 g/kg

Bendiokarb (karbamaat)

NET CONTENTS: / NETTO INHOUD: 125 g sachets / sakkies

### REGISTRATION HOLDER / REGISTRASIEHOUER:

Bayer (Pty.) Ltd. / (Edms.) Bpk.  
Reg. No. / Nr. 1968/011192/07  
P.O. Box / Posbus 143  
ISANDO 1600  
SOUTH AFRICA / SUID-AFRIKA  
TEL: (011) 921 5911

Batch no./Lotnommer:

Date manufactured/Datum vervaardig:

FICAM<sup>®</sup> is a registered trademark of Bayer / is 'n geregistreerde handelsmerk van Bayer

UN No. / VN Nr. 2757



# FICAM® VC

Reg. No. L3141 Act No. 36 of 1947  
Namibian Reg. No. N-AR 0709  
Mozambique Reg. No. DSV-544

A WETTABLE POWDER FORMULATION OF A RESIDUAL CONTACT INSECTICIDE FOR THE CONTROL OF ADULT MALARIA MOSQUITO VECTORS IN STRUCTURES.

Active ingredient: Bendiocarb (carbamate) 800 g/kg

## **REGISTRATION HOLDER:**

Bayer (Pty.) Ltd. / (Edms.) Bpk.  
Reg. No. / Nr. 1968/011192/07  
P.O. Box / Posbus 143  
ISANDO 1600  
SOUTH AFRICA / SUID-AFRIKA  
TEL: (011) 921 5911



**HARMFUL**

## **WARNINGS:**

Handle with extreme care.  
Poisonous when swallowed, inhaled or absorbed through the skin.  
Toxic to poultry, fish, bees and wildlife.  
Store away from food and feedstuffs.  
Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.  
In case of poisoning call a doctor and make this label available to him.

## **PRECAUTIONS:**

Do not inhale dust or spray mist.  
Wear full protective clothing - overall, rubber boots, gloves and suitable face mask.  
Wash contaminated clothing immediately.  
Wash with soap and water immediately after use or accidental skin contact.  
Do not eat, drink or smoke whilst mixing or applying or before washing hands and face and changing clothing.  
Avoid drift onto areas not under treatment.  
Clean applicator before using for other remedies.  
Destroy empty sachet after use and never use for any other purpose.  
Prevent contamination of food, feeds, drinking water and eating utensils.  
Do not apply to surfaces on which raw or processed food or feed is stored, prepared or eaten.  
Do not apply to the insides of food containers, chutes and conveyors where it may at any time come into contact with raw or processed food or feed.  
Do not apply to humans, animals, clothes or bedding.  
Remove chickens, ducks and pets before application until the product has dried off. Remove dead cockroaches and other insects from the premises to avoid ingestion of these insects by chickens, ducks and pets.

## **SYMPTOMS OF POISONING**

Headache, fatigue, faintness, nausea, giddiness, excessive sweating, abdominal pain, vomiting, blurred vision, muscle twitching, usually small pupils, respiratory distress, coma.

## **FIRST AID TREATMENT**

Remove patient from source of poisoning and keep him quiet and reassured. Remove contaminated clothing and rinse contaminated body area thoroughly with plenty of soap and cold water - do not rub skin hard. If large amount has been swallowed induce vomiting by tickling the back of the throat. Repeat until vomit fluid is clear. Take the patient immediately to the nearest physician. Administer artificial respiration or closed chest cardiac massage if necessary. Do not apply direct mouth to mouth respiration. Never give anything by mouth to an unconscious person.

## **NOTE TO PHYSICIAN**

Atropine sulfate 2 - 4 mg (adult) intravenously repeated at 10 minute intervals until atropinization (dry flushed skin and tachycardia) appears. Pralidoxime (2-pam or protopam) and other oximes are contraindicated.

## **DIRECTIONS FOR USE: USE ONLY AS DIRECTED.**

For the control of adult mosquitoes in buildings and houses: Apply by compression sprayer to walls, doors, window frames and ceilings.

To open, tear off one end of outer sachet. Remove inner water soluble sachet and place directly into spray tank containing the correct volume of water. **DO NOT OPEN THE INNER SACHET.** Mix well to ensure good suspension. If spraying is interrupted, shake before re-commencing with spraying.

Apply using a compression sprayer complying to WHO specifications (such as a Hudson Xpert), fitted with a flat fan nozzle. Hold the nozzle 45 cm away from the surface to be sprayed and spray at a tempo of 2.5 seconds per meter.

**Porous surfaces** (e.g. mud hut walls, rough stone walls, rough concrete walls): Mix 125 g (**one sachet**) in **10 litres** of water and apply to **250 m<sup>2</sup>** to give a target deposit of 400 mg active ingredient per m<sup>2</sup>. Use a 8002 nozzle.

**Non-porous surfaces** (e.g. reeds, tiled walls, painted brick or concrete walls): Mix 250 g (**two sachets**) in **10 litres** of water and apply to **500 m<sup>2</sup>** to give a target deposit of 400 mg active ingredient per m<sup>2</sup>. Use a 8001 nozzle.

Where the product is applied for adult malaria mosquito control it will also control cockroaches, bedbugs, ants, fishmoths and adult houseflies if these are present in the sprayed premises.

For any product enquiry, contact Bayer Environmental Science - 011 921 5911. For poisoning emergencies only, Griffon Poison Information Centre may also be contacted - 082 446 8946.

**FICAM**<sup>®</sup> is a registered trademark of Bayer.

© Bayer (Pty.) Ltd. All unauthorized reproduction of this label is forbidden.

[www.bayervector.co.za](http://www.bayervector.co.za)

# FICAM® VC

Reg. Nr. L3141 Wet Nr. 36 van 1947  
Namibiese Reg. Nr. NAR 0709  
Mosambiekse Reg. Nr. DSV-544

'N BENATBARE POEIER FORMULASIE VAN 'N NAWERKENDE KONTAK INSEKDODER VIR DIE BEHEER VAN DIE VERMELDE INSEKTE.

Aktiewe bestanddeel: Bendiokarb (karbamaat)

800 g/kg

## **REGISTRASIEHOUER:**

Bayer (Pty.) Ltd. / (Edms.) Bpk.  
Reg. No. / Nr. 1968/011192/07  
P.O. Box / Posbus 143  
ISANDO 1600  
SOUTH AFRICA / SUID-AFRIKA  
TEL: (011) 921 5911



**SKADELIK**

## **WAARSKUWINGS:**

Hanteer baie versigtig.

Giftig indien ingesluk, ingeasem of deur die vel geabsorbeer word.

Giftig vir pluimvee, visse, bye en wild.

Bêre weg van voedsel en voer.

Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.

Ingeval van vergiftiging ontbied 'n geneesheer en maak hierdie etiket aan hom beskikbaar.

## **VOORSORGMATREËLS:**

Moet nie poeier of sproeinewel inasem nie.

Dra volle beskermende klere - oorpakke, rubberskoene, handskoene en geskikte gesigmasker.

Besoedelde klere moet onmiddellik gewas word.

Was met seep en water onmiddellik na toevallige velkontak.

Moet nie eet, drink of rook tydens vermenging of toediening nie of voordat hande en gesig gewas is en skoon klere aangetrek is nie.

Maak toerusting skoon voordat dit vir ander chemikalieë gebruik word.

Vernietig leë sakkie na gebruik, en moet NOOIT vir enige ander doel gebruik nie.

Voorkom die besoedeling van kos, voer, drinkwater en eetgerei.

Moet nie op oppervlakke toedien waar rou of geprosesseerde voedsel of voer geberg, voorberei of geëet word nie.

Moet nie aan die binnekant van voedselhouders, glybane en voerbane toegedien, waar dit ter enigertyd met rou of geprosesseerde voedsel of voer in aanraking kan kom nie.

Verwyder hoenders, eende en troeteldiere voor toediening totdat die produk droog geword het.

Verwyder dooie kakkerlakke en ander insekte van die perseel om inname van die insekte deur hoenders, eende en troeteldiere te verhoed.

## **SIMPTOME VAN VERGIFTIGING**

Hoofpyn, vermoeidheid, flouheid, duiseligheid, oormatige sweet, mislikheid, buikpyn, braking, belemmerde gesigsvermoë, spiertrekking, gewoonlik verkleinde pupille, asemhalingsnood, bewusteloosheid.

## **NOODHULPBEHANDELING**

Verwyder die persoon van die bron van vergiftiging, stel hom gerus en hou hom stil. Verwyder besoedelde klere en spoel die besmette liggaamsdele met baie seep en koue water af - moet nie die vel hard vrywe nie. Indien groot hoeveelhede ingesluk is, veroorsaak braking deur die agterste gedeelte van die keel te prikkel. Herhaal tot die braaksel helder is. Neem die pasiënt onmiddellik na die naaste geneesheer. Pas kunsmatige asemhaling of geslote hartmassering toe indien nodig. Moet nie direkte mond tot mond asemhaling toepas nie. Moet nooit iets per mond toedien aan 'n bewustelose persoon nie.

## **NOTA AAN GENEESHEER**

Dien atropiensulfaat 2 - 4 mg (volwassene) binnears toe met 10 minute tussenposes tot die eerste tekens van atropinisasie (droë, gloeiende vel en tachycardea) voorkom. Pralidoksiem (2-pam of protopam) en ander oksieme word nie aanbeveel nie.

## **GEBRUIKSAANWYSINGS:** GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI.

Vir die beheer van volwasse muskiete in geboue en woonhuise: Wend aan deur middel van 'n drukspuittoestel aan mure, deure, vensterrame en plafonne.

Om oop te maak skeur een kant van die buitenste sakkie af. Haal binneste water-oplosbare sakkie uit, en plaas in spuittenk wat die korrekte volume water bevat. **MOET NIE DIE BINNENSTE SAKKIE OOP MAAK NIE.** Meng goed voor bespuiting begin. As bespuiting onderbreek word, skud goed voordat bespuiting hervat word.

Wend aan met 'n kompressiespuittoestel met 'n plat waaierspuitpunt wat aan WHO spesifikasies voldoen (byvoorbeeld Hudson Xpert). Hou die spuitpunt 45 cm weg van die oppervlak wat gespuit moet word en spuit teen 'n tempo van 2.5 sekondes per meter.

**Poreuse oppervlakke** (bv. modderhutmure, rowwe klipmure, rowwe betonmure): Meng 125 g (**een sakkie**) in **10 liter** water en dien toe op **250 m<sup>2</sup>** om 'n deposito van 400 mg aktief per m<sup>2</sup> te verkry. Gebruik 'n 8002 spuitpunt.

**Nie-poreuse oppervlakke** (bv. riete, geteëde mure, geveerde baksteen- of betonmure): Meng 250 g (**twee sakkies**) in **10 liter** water en dien toe op **500 m<sup>2</sup>** om 'n deposito van 400 mg aktief per m<sup>2</sup> te verkry. Gebruik 'n 8001 spuitpunt.

Waar die produk gespuit word teen malariadraende muskiete, sal kakkerlakke, weeluse, miere, vismotte en volwasse huisvlieë ook beheer word as dit op die behandelde perseel teenwoordig is.

Vir enige produk navrae, skakel Bayer Environmental Science - 011 921 5911. Slegs vir vergiftigingsnoodgevalle kan Griffon Gif Inligtingsentrum ook gekontak word - 082 446 8946.

**FICAM**<sup>®</sup> is 'n geregistreerde handelsmerk van Bayer.

© Bayer (Edms.) Bpk. Alle ongemagtigde kopiëring van die etiket is verbode.

[www.bayervector.co.za](http://www.bayervector.co.za)