



ULTRAKILL RAT AND MOUSE LIQUID BAIT

REG. NO. L9476 Act No. 36 of 1947

REG. NR. L9476 Wet Nr. 36 van 1947

A highly active, anticoagulant liquid concentrate to be used to prepare a liquid bait for the control of rats and mice in the domestic, industrial and public health markets.

'n Hoogs aktiewe teenbloedstillingsmiddel vloeistof konsentraat om n vloeistof lokaas aantemaak vir die beheer van rotte en muise in huishoudelike-, industriële- en openbare gesondheidsmarkte.

ACTIVE INGREDIENT: / AKTIEWE BESTANDDEEL:

DIFENACOUM (anticoagulant).....0,8 g/kg.....DIFENAKUM (teenbloedstillingsmiddel)

NET CONTENTS/ NETTO INHOUD: 200ml

REGISTRATION HOLDER/REGISTRASIEHOUER:

Starplex 83 CC
P.O. Box 14374
BREDELL 1623
SOUTH AFRICA
+27119794246/7

Distribution by:
Coopers Environmental Science (Pty) Ltd
Reg. No. 2000/02366/70/7
91 Maple Street
POMONA 1619
SOUTH AFRICA
TEL: +2711 979-4246/7

UN NO. 1950



WARNINGS

- Handle with extreme care and especially avoid contact by mouth.
- Poisonous if swallowed and upon contact with skin.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, UNINFORMED PERSONS, BIRDS AND OTHER ANIMALS, ESPECIALLY PETS, PIGS AND HORSES.
- Toxic to fish and wildlife.
- Store in original container tightly closed, in a safe place away from food and feedstuffs.
- Do not place the bait at random but follow the directions for use.
- IN CASE OF ACCIDENTAL CONSUMPTION CALL A DOCTOR AND MAKE THIS LABEL AVAILABLE TO HIM.

PRECAUTIONS

- When handling or putting out the bait, wear rubber gloves and wash hands afterwards.
- Prevent contamination of edible commodities, eating utensils and drinking water.
- Destroy empty container and never re-use for any other purpose.
- SELECT BAITING POINTS WHERE BAIT WILL BE INACCESSIBLE TO CHILDREN AND DOMESTIC ANIMALS.
- Do not eat, drink or smoke while handling the bait.
- Remove all remains of the bait and bait containers after treatment and burn or bury. Search for and burn or bury all rodent carcasses. Do not place them in refuse bins or on rubbish tips.

SYMPTOMS OF HUMAN POISONING

- An increased tendency to bleed could indicate accidental poisoning, e.g. nose bleeds, bleeding gums and bruises under the skin, and haemorrhaging into and around elbow and knee joints and blood in urine and faeces.

FIRST AID TREATMENT

- **IF IN EYES:** Flush with clean water for at least ten minutes. If irritation persists, obtain medical advice.
- **IF INGESTED:** Wash mouth out. If bait is swallowed, OBTAIN MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY. DO NOT induce vomiting.

ONLY if medical assistance is not readily available and if a large quantity has been swallowed, then vomiting can be induced provided the patient is conscious. TAKE PATIENT TO NEAREST PHYSICIAN AS SOON AS POSSIBLE.

NOTE TO PHYSICIAN

Difenacoum is an indirect anticoagulant. Phytomenadione, Vitamin K1, is antidotal. Determine prothrombin times not less than 18 hours after consumption. If elevated, administer Vitamin K1 and continue until prothrombin times normalise. Continue determination of prothrombin time for three days after withdrawal of antidote and resume treatment if elevation occurs in that time.

DIRECTIONS FOR USE: USE ONLY AS DIRECTED

Shake well before use.

FEATURES

- * Two or more feeds kill rodents.
- * Used to formulate a highly active bait.
- * Contains Bitrex[®] - a human taste deterrent.
- * Contains warning dyes.

BAIT PREPARATION

To make 1 ℓ of water bait, thoroughly mix 20 mℓ of concentrate with 1 litres of water. Use only potable water. Do not use contaminated or stagnant water. Charge the mixing vessel with the appropriate amount of water. Add the concentrate, and mix by stirring or shaking.

APPLICATION

Before laying bait, thoroughly explore the site to locate centres of infestation, runways and burrows.

Water Baits:

Place the diluted bait in big bait dispensers such as the **Coopers Rat Bar**. Use 200 mℓ of liquid bait at each baiting point. To obtain best results it is desirable that alternative water sources are eliminated.

Site baiting points in a good number of locations throughout the infested area. Cover the baiting points to prevent access by animals and birds. Inspect baiting points daily, particularly during the first ten days. Thereafter inspect at least weekly. Continue replenishing bait points until they are left untouched. It is recommended that when liquid baits are used, consideration be given to also using cereal baits at the same time.

BITREX[®] IS THE REGISTERED TRADE MARK OF MACFARLAN SMITH

For any product enquiry, contact Coopers Environmental Science (Pty) Ltd - 011 979 4246/7. For poisoning emergencies only, Griffon Poison Information Centre may also be contacted - 082 446 8946.

WAARSKUWINGS

- Hanteer versigtig en voorkom veral aanraking met die mond.
- Giftig indien ingesluk en deur kontak met die vel.
- **HOU BUIE BEREIK VAN KINDERS, ONVERANTWOORDELIKE/ONINGELIGTE PERSONE, VOËLS EN ANDER DIERE, VERAL TROETELDIERE, VARKE EN PERDE.**
- Giftig vir vis en wild.
- Bêre in oorspronklike houer, dig toegemaak, agter slot en grendel en weg van voedsel en voer.
- Moenie die aas lukraak plaas nie, maar volg die **GEBRUIKSAANWYSINGS** noukeurig.
- **IN GEVAL VAN TOEVALLIGE VERGIFTIGING, MOET 'N DOKTER ONTBIED WORD EN TOON HOM HIERDIE ETIKET.**

VOORSORGMAATREËLS

- **DRA RUBBERHANDSKOENE** wanneer die lokaas hanteer en uitgesit word en was hande daarna.
- Voorkom besmetting van voedsel, voer en drinkwater.
- Vernietig die leë houer en moet dit nooit vir enige ander doel hergebruik nie.
- **KIES DIE LOKAASPLASINGSPUNTE SODAT DIE LOKAAS ONTOEGANGLIK IS VIR KINDERS EN TROETELDIERE.**
- Moenie eet, drink of rook terwyl die lokaas hanteer word nie.
- Verwyder alle oortollige lokaas na behandeling en doen weg daarmee op 'n verantwoordelike wyse. Soek vir en verbrand knaagdierkarkasse. Moet hulle nie in vuilgoedblikke of op stortterreine weggooi nie.

SIMPTOME VAN MENSLIKE VERGIFTIGING

- 'n Toenemende neiging tot bloeding kan dui op toevallige vergiftiging, bv. bloeiende neus en tandvleise, kneusplekke onder die veloppervlak, bloeding in- en om die elmboë en knieë en bloed in die uitskeidings.

NOODHULPBEHANDELING

- **INDIEN IN OË:** Spoel met skoon water vir minstens tien minute. Indien irritasie voortduur, moet mediese advies ingewin word.
- **INDIEN INGENEEM:** Was die mond uit. Indien die lokaas ingesluk is, **VERKRY ONMIDDELLIK MEDIESE BYSTAND.** MOENIE braking veroorsaak nie.

ALLEENLIK wanneer mediese bystand nie gereedlik beskikbaar is nie of as 'n groot hoeveelheid ingeneem is, kan braking veroorsaak word mits die pasiënt nie bewusteloos is nie. **NEEM DIE PASIËNT SO GOU MOONTLIK NA DIE NAASTE GENEESHEER.**

NOTA AAN GENEESHEER

Difenakum is 'n indirekte teenbloedstollingsmiddel. Vitamiene K1 (fitomenadioon) is 'n teenmiddel. Indien vergiftiging vermoed word, moet protrombientyd binne 18 uur na inname bepaal word. As 'n styging voorgekom het, moet Vitamiene K1 deur 'n stadige binneare inspuiting toegedien word. Duur voort tot protrombiebytd stabiliseer. Gaan voort met mondelinge behandeling van Vitamiene K1 totdat die protrombientyd vir drie dae normaal gebly het.

GEBRUIKSAANWYSINGS: GEBRUIKS SLEGS SOOS AANGEDUI

Skut deeglik voor gebruik

EIENSKAPPE

- Twee of meer voedings sal knaagdiere doodmaak.
- Word gebruik om 'n uiters aktiewe aas te formuleer.
- Bevat Bitrex® - 'n menslike smaak afskrikmiddel.
- Bevat waarskuwing kleurstof.

AAS VOORBEREIDING

Om 1 ℓ vloeistof aas aan te maak, meng 20 ml konsentraat deeglik met 1 liter water. Gebruik slegs drinkbare water. Moet nie besmette of stilstaande water gebruik nie. Voeg die aanbevole volume water in die vermengings houer. Voeg dan die konsentraat by en meng deur te roer of te skud.

AANWENDING

Voor lokaas geplaas word, verken die terrein deeglik en identifiseer areas van infestasië, soos deur rotpaadjies en gate op te spoor.

Water aas

Plaas die afgewaterde aas in groot aas voerders soos die **Coopers Rot Kroeg**. Gebruik 200 ml van die vloeibare lokaas by al die lokaas punte. Om die beste resultate te verkry, word dit aanbeveel dat alternatiewe bronne van vloeistof uitgeskakel word.

Plaas na aanleiding van inspeksie lokaas punte in verskeie plekke in die besmette gebied. Dek die lokaas punte om toegang deur diere en voëls te voorkom. Inspekteer lokaas punte daaglik, veral gedurende die eerste tien dae. Inspekteer daarna ten minste weekliks. Vul lokaas punte totdat hulle onaangeraak gelaat word. Dit word aanbeveel dat wanneer vloeibare lokaas gebruik word, dit oorweeg word om ook gebruik te maak van graan aas op dieselfde tyd.

Bitrex® is die geregistreerde handelsmerk van Macfarlan Smith.

Vir enige produk navrae, skakel Coopers Environmental Science (Pty) Ltd - 011 979 4246/7. Slegs vir vergiftigingsnoodgevallen kan Griffon Gif Inligtingsentrum ook gekontak word - 082 446 8946.

www.cooperses.com